

Hépatite A

- **Avaxim® 160** (adulte et enfant de plus de 16 ans)
Havrix® 1440 Adulte
Havrix® 720 Nourrissons et Enfants (de 1 à 15 ans)
Nature du vaccin : virus entier inactivé

L'hépatite A est une maladie du foie provoqué par le **virus de l'hépatite A** (VHA). Ce virus se propage lorsqu'une personne non immunisée boit ou mange quelque chose qui a été contaminée par les selles d'un sujet infecté par le VHA (virus très résistant dans le milieu extérieur) : c'est ce qu'on appelle la **périal fécal**.

Comme toutes les maladies à transmission oro-fécale, l'hépatite A survient le plus souvent dans des **zones où l'hygiène est précaire**, et frappe principalement les pays en développement en **Asie**, en **Afrique** ou en **Amérique Latine**. La maladie n'a pas totalement disparu des pays industrialisés ; les cas d'importations après un voyage sont de plus en plus fréquent.

Le risque d'une hépatite A est 40 fois plus important qu'une fièvre typhoïde et 800 fois plus important que celui du choléra.

IMPORTANT : dans tous les cas les **règles d'hygiène alimentaire** et **d'hygiène des mains** doivent toujours être respectées.

Recommandations / indications vaccinales :

- **adultes non immunisés** et **enfants âgés de plus de 1 an** séjournant en zone d'endémie,
- jeunes dans les établissements pour l'enfance et la jeunesse handicapées,
- patients atteints de **mucoviscidose** et/ou de **pathologie hépatobiliaire chronique** susceptible d'évoluer vers une hépatopathie chronique (notamment dues aux virus de l'hépatite B, de l'hépatite C ou à une consommation excessive d'alcool),
- enfants, à partir de l'âge de 1 an, nés de **famille** dont l'un des membres (au moins) est **originaire** d'un **pays de haute endémicité** et qui sont susceptibles d'y séjourner,
- **homosexuel** masculin,
- **l'entourage familial** ou toute personne vivant sous le même toit d'un cas :
 - vacciner dans un délai maximum de 14 jours suivant l'apparition du cas, les personnes qui n'ont jamais été vaccinées : nées après 1945, sans antécédent d'ictère et n'ayant pas séjourné plus d'un an dans un pays de forte endémicité
 - si l'une des conditions n'est pas remplie, la sérologie (Ac totaux hépatite A) au préalable est fortement recommandée,
- des communautés de vie en situation d'hygiène précaire (cf. Ddass ± CIRE),
- **sujet professionnellement exposé** à un risque de contamination :
 - personnel de crèches, assistante maternelle... qui s'occupent d'enfants n'ayant pas atteint l'âge de la propreté
 - des structures collectives d'accueil pour personnes handicapées
 - en charge de traitement des eaux usées
 - impliqué dans la préparation alimentaire en restauration collective.

Schéma vaccinal :

Primovaccination : 1 injection

Rappel : 1 injection entre 6 mois et 12 mois (possible jusqu'à 36 mois voire 5 ans)

Contre-indications :

- infection fébrile,
- hypersensibilité connue à l'un des constituants du vaccin ou apparue après une injection du vaccin,
- enfant de moins de 1 an.

Hépatite A + Typhoïde


→ **Tyavax®** (adulte et enfant de plus de 16 ans)

Nature du vaccin : Hépatite A : virus entier inactivé et
Fièvre typhoïde : polyside capsulaire.

Recommandations / indications vaccinales :

Immunsation active conjointe contre la fièvre typhoïde et l'infection provoquée par le virus de l'hépatite A chez les sujets âgés de plus de 16 ans effectuant des séjours prolongés, répétés ou à risque dans des pays à bas niveau d'hygiène.

Schéma vaccinal :



Le vaccin peut être associé à tous les autres vaccins, en des points d'injection différents.

Hépatite A + Hépatite B

→ **Twinrix® adulte** (adulte et enfant de plus de 16 ans)

Twinrix® enfant (enfant de 1 an à 15 ans)

Nature du vaccin : Hépatite A : virus entier inactivé et
Hépatite B : protéine recombinante de l'enveloppe virale .

Les indications, les effets indésirables ou les contre-indications sont respectivement celles de chacun des deux vaccins.

ATTENTION

- la **primovaccination** (M0, M1) par le vaccin combiné doit **TOUJOURS** être poursuivie avec le même vaccin combiné.
- ce vaccin combiné ne doit **JAMAIS** être utilisé comme rappel des primovaccinations d'hépatite A ou d'hépatite B faites séparément.

La valence hépatite B n'est pas remboursée par la Sécurité sociale avec le Twinrix.